

2- La désinfection

La désinfection de l'environnement du malade intervient obligatoirement le jour du traitement local, ou le lendemain de la prise des comprimés. Elle concerne les habits portés et par extension tout linge ou tissu mobilier utilisé par lui dans les quatre jours antérieurs au nettoyage (housse de coussin, de fauteuil, tapis, housse de voiture...). Chaque élément est enfermé hermétiquement dans un sac pendant quatre heures, après avoir été vaporisé à sa surface par un produit anti-acarien acheté en pharmacie, pour être ensuite lessivé. Seul le linge lavable à 60 degrés peut passer directement en machine et être exempté de pulvérisation. La mise en quarantaine des objets ni lavables ni traitables est de huit jours.



vous guider

ÉVITEZ-VOUS UNE GALE...ÈRE

■ Maladie facilement transmissible
Traitements et désinfection



Réalisation MSA Mayenne-Orne-Sarthe - Images : Thinkstockphotos.fr - Janvier 2013

N'hésitez pas à contacter votre MSA

www.msa-mayenne-orne-sarthe.fr

MSA Mayenne-Orne-Sarthe
Adresse postale Tél. 02 43 39 43 39
30 rue Paul Ligneul Fax : 02 43 39 43 43
72032 Le Mans Cedex 9 www.msa-mayenne-orne-sarthe.fr




L'essentiel & plus encore



L'essentiel & plus encore



LA GALE : SYMPTÔMES, & PROPAGATION



Connaissez-vous la sarcopte ? Il s'agit d'un acarien d'un demi millimètre dont la femelle est responsable de la gale. Ce parasite creuse des petits tunnels sous la peau des humains pour y déposer ses œufs. Chacun peut être touché, indépendamment de son origine sociale ou de son mode de vie.

■ Démangeaisons sévères

La gale se caractérise par des démangeaisons sévères – notamment nocturnes – qui interviennent dans un délai de trois à six semaines après la ponte des œufs de la femelle sarcopte. Les zones du corps les plus exposées sont les espaces entre les doigts et tous les *sillons* (plis des coudes, aisselles, nombril, organes génitaux...). L'entourage proche du malade peut également être infecté par contact cutané direct avec

ce dernier, mais aussi avec du linge contaminé. A titre d'exemple, le personnel chargé de toilettes ou de soins auprès de personnes âgées vivant en institution y est particulièrement sensible.

Conduite à tenir en cas de survenue de gale

Dès l'apparition des premiers symptômes, le plus important est de les signaler rapidement à son médecin traitant. En effet, même si la gale n'est pas une maladie grave, un traitement adapté est indispensable pour en guérir :

- 1- alertez votre médecin traitant dès les premières démangeaisons,**
- 2- suivez à la lettre ses prescriptions en matière de traitement et de désinfection.**

Ainsi, vous éviterez de surcroît la propagation de la maladie.

Pour être convenablement combattue, la gale nécessite la conjugaison de deux types de remèdes complémentaires. Il convient en effet de "guérir" à la fois le malade et son environnement.

■ 1- Les traitements

La personne infectée, mais aussi ses proches, du fait des risques importants de transmission de cette maladie, sont soumis à un traitement oral et/ou local, fonction du choix du médecin, de leur âge, poids et situation particulière (par exemple une grossesse). La posologie doit être respectée à la lettre et accompagnée de mesures d'hygiène additionnelles (douches, bains, changement strict de vêtements...) qui sont détaillés par le professionnel de santé.